

# גליגן GALIGAN

**קוטל עשבים בררני מונע הצצה ומדביר עשבים קיימים בהדרים, במטעים, בירקות, בגידולי שדה, בצמחי נוי ויער ובהכנת שטחים - תרכיז מתחלב**  
**מכיל 240 גרם בליטר oxyfluorfen**

גליגן המופעל מהסתיו ועד האביב בהמטרה או בגשם ימנע את הצצת העשבים הבאים לתקופה ממושכת בהתאם לעונה ולמינון ויקטול בריסוס את אותם העשבים שגובהם עד 10 ס"מ (למעט הדגניים שרק הצצתם תימנע):  
**רחבי עלים** - חבללוב קעור, ענבי שועל, אבוטילון, חבלבל (מזרעים), לכיד, דטורה, חלמית, מעוג, ירבוזים, רגלה, לשישית הצבעים, ארכובית, בר-גביע, מרור הגינה, מצליבים (למעט שחליל שרוע), סביון, אמיר קוצני, נזמית, סרפד, ברקן, עשנן וגדילן. השיבוש בחבלבל וזירבוז שרוע יימנע לתקופה קצרה. סוככיים ייצרבו ונביטם תימנע לתקופה קצרה. צמחי קייצת אינם נצרבים ונביטתם אינה נמנעת ע"י טיפול בגליגן.  
**דגניים** - שיבולת שועל, חפורית, דוחנית השלחין ואצבען מאדים.

## הוראות שימוש

**לקראת הטיפול למניעת הצצה:** רסס על קרקע חלקה ללא רגבים. עיבוד השטח לאחר הריסוס יפחית את פעילות התכשיר במניעת הצצה. טמפרטורות גבוהות יקצרו את משך פעולת מניעת ההצצה של התכשיר. היווצרות בקיעים בקרקע מטופלת בגליגן תאפשר הצצת עשבים.

**הפעלת התכשיר:** גליגן ימנע הצצת עשבים לאחר שיופעל ע"י גשם או המטרה בשיעור 10 מ"מ לפחות. יש להפעילו בקיץ לא יאוחר מ-7 ימים ובחורף לא יאוחר משבועיים לאחר הריסוס.

**הערות לטיפול:** אין לרסס גליגן בחממות ובמבנים סגורים. אין לרסס בתנאי לחות ובתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה, שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, נזקי קרה, חוסר אוורור קרקע, נזק מקוטלי עשבים ועוד. גליגן צורב צמחים. הימנע מרחף לגידולים שכנים וצמחי תרבות.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצמח ולביקורת: 96/ הגה"צ / 1425

HRAC סיווג: E

אריזות: 0.5 ל', 1 ל', 5 ל'

דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר התייבשות התרסיס

מיוצר ומשווק ע"י אדמה-אגן בע"מ



## מטעים והדרים

הדברת עשבייה קיימת בשילוב ראונדאפ/גלייפוגן: הדברת עשבים דגניים ורחבי-עלים חד-שנתיים וחבלכל בשילוב ראונדאפ/גלייפוגן. נפח התרסיס: 20-30 ליטר לדונם.

| המינון (סמ"ק לדונם) |          | הגידול   |
|---------------------|----------|--|
| ראונדאפ/גלייפוגן**  | גליגן    |  |
| *300 - 150          | 30       | <b>מטעים והדרים***</b>   |
| *200 - 150          | *50 - 30 | הכנת שטחים לפני זריעה של כותנה, אבטיח, חמניות, עגבניות לתעשייה |
| 150                 | *50 - 30 | הכנת שטחים לפני שתילה של אבטיח, עגבניות לתעשייה                |

\* המינון הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה. \*\* ראה מגבלות בתוויות ראונדאפ/גלייפוגן. \*\*\* היזהר מהרטבת עלוות הגידול בשעת הריסוס.

## יער, פרחים, צמחי ועצי נוי

יש להימנע מהרטבת העלווה של צמחי התרבות. (ראה סעיף "הפעלת התכשיר")

| הגידול  | מועד הריסוס  | המינון (סמ"ק/ד')                      | נפח התרסיס (ל'/ד')                         |
|---|--|---------------------------------------|--|
| אורן ירושלמי, ברוש מצוי מהנטיעה ואילך   | אוקטובר-נובמבר כשגובה העשבייה החד-שנתית לא יותר מ-10 ס"מ | 400                                   | 50 - 20                                    |
| סייפן (פקעות מגודל 4 ומעלה) מהזנים טריידר - הורן ופיטר- פירס  | לאחר שתילת הפקעות וטרם הצצתם                             | 300 - 200                             | 50 - 30                                    |
| פרח שעווה   | לאחר השתרשות   | 300 בקרקע קלה<br>300-500 בקרקע כבדה.  | כ-20 - 50. היזהר מהרטבת העלווה בשעת הריסוס |
| פיטוספורום, מללויקה, איבנימוס, חבושית, בוהיניה, ז'קרנדה, ספיון, פיקוס בנימינה, קלורוטריה, אלה אטלנטית | החל מהשנה השנייה לאחר הנטיעה                             | 300 - בקרקע קלה.<br>500 - בקרקע כבדה. |  |

# גליגן (המשך) GALIGAN

## גידולי שדה

**נפח התרסיס:** 30-50 ליטר לדונם (הנפח הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה)

| הגידול  | מועד הריסוס  | המינון (סמ"ק/ד')         | אופן הריסוס  |
|---|--|--------------------------|--|
| כותנה שלחין לסיבים מושקית בהמטרה - ריסוס מסיים                                  | כשהכותנה בגובה 25-30 ס"מ לפחות והעשבים לא יותר מ-10 ס"מ. לא יאוחר מ-60 יום לפני הקטיף. | 200                      | התרסיס יכוון כך שלא יפגע בנוף צמחי הכותנה, אלא בבסיס גבעוליהם בלבד ובעשבים שבמרווח בין השורות. <sup>(1)</sup>  |
| כותנה שלחין לסיבים מושקית בטפטוף - ריסוס מסיים                                  | כשהכותנה בגובה 25-30 ס"מ לפחות והעשבים לא יותר מ-10 ס"מ.                               | 100 + 100 ברומטריל       | ריסוס מוגן <sup>(2)</sup> : התרסיס יכוון כך שלא יפגע בנוף צמחי הכותנה ובגבעוליהם, אלא כ-20 ס"מ משורת הכותנה ובעשבים הנמצאים במרווח בין השורות, משני צדי שלוחות הטפטוף.                   |
| עגבניות לתעשייה שתולות שתילי גוש בשדה הגלוי בלבד (ללא חיפוי או כיסוי פוליאתילן) | קדם שתילה, אולם לא בשדה שיישתל לפני 1 באפריל.  | 200                      | רסס את התכשיר והפעל אותו בהמטרה, לפחות שבועיים לפני השתילה. עדיפה שתילה בדקר כדי להימנע מהזזת קרקע מטופלת. גשם או המטרה אחרי השתילה עלולים לגרום לעיכוב, לצריבת עלווה ו/או לפחיתה ביכול. |
| אבטיח מזן סידלס 313 (גידול גלוי או מכוסה - בקרקע מחופה בלבד)                    | קדם שתילה  | 150 - 200 <sup>(3)</sup> | רסס את התכשיר והפעל בהמטרה לפני החיפוי. שתול את האבטיחים לפחות 7 ימים לאחר הטיפול.   |

(1) הימנע מהרטבת עלי הכותנה. ייתכן שיופיעו סימני הצהבה או צריבות בעלים התחתונים שייעלמו לאחר מכן ואין להם השפעה על רמת היבולים.

(2) ריסוס מוגן: פומיות המוקפות מלמעלה ומהצדדים במגנים העשויים פח או פלסטיק.

(3) המינון הנמוך בקרקע קלה ובינונית, הגבוה בקרקע כבדה.

**הערה:** לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע ביסודיות לעומק של 5-10 ס"מ.



## ירקות

**נפח התרסיס:** 15-30 ליטר לדונם (הנפח הנמוך לעשבייה נמוכה, הגבוה לעשבייה גבוהה)

| הגידול               | מועד הריסוס                                    | המינון (סמ"ק/ד')                   | הערות  |
|----------------------|--|------------------------------------|--|
| כרוב, כרובית (2)     | קדם שתילה<br>נובמבר עד מרץ<br>אפריל עד אוקטובר | 150 - 200 (1)<br>200 - 250 (1) (2) | מרססים התכשיר ומפעילים<br>בהמטרה שבוע לפני השתילה.<br>שתול בדקר והימנע ככל האפשר<br>מהזזת קרקע מטופלת. |
| בטטות (6)            | קדם שתילה                                      | 150                                |  |
| בצל (שתול)           | קדם שתילה                                      | 200                                |  |
| בצלצלים "בית אלפא"   | אחרי נעיצה, לפני הצצה                          | 200                                | צריך להמטיר ב-10 מ"מ לפחות<br>לאחר הריסוס  |
| בצל (זרוע ושתול) (3) | משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה (4)               | 100 - 150 (5)                      | לאחר הריסוס עלולות להופיע<br>צריבות בעלים שייעלמו תוך 2 - 3<br>שבועות ולא יפגעו ביבול.                 |
| שום זן שני (3)       | משלב של 4 עלים מפותחים ומעלה (4)               | 100 - 200 (5)                      |  |
| קנרס (ארטישוק)       | קדם התעוררות בקנרס מבוסס                       | 200-350 (1)                        | רסס לפני השקיית התעוררות. במינון<br>הנמוך ניתן לשלב עם דיאורקס 100<br>סמ"ק/ד.                          |
|                      | לאחר שתילה (שתילים יבשים)                      | 200                                | רסס לפני השקיית התעוררות.  |

(1) המינון הנמוך בקרקע קלה וכינונית, הגבוה בכבדה.

(2) בזן טייסטי בקיץ, לא יותר מ-200 סמ"ק/ד'.

(3) אל תרסס בצל ושום בעקה, צמא או בקליטה חלקית. אל תשלב גליגן עם קוטלי עשבים נוספים מחשש להגברת הצריבות.

(4) אל תרסס בצל ושום תוך 40 יום לפני האסיף.

(5) המינון הנמוך לעשבייה נמוכה ודלילה, הגבוה לעשבייה צפופה.

(6) ספטמבר-אפריל.

**הערה:** לפני גידול נוסף יש לעבד את הקרקע ביסודיות לעומק של 5-10 ס"מ.

# גליגן (המשך) GALIGAN

## הדרים ומטעים

נפח התרסיס: 20-30 ליטר לדונם. (ראה סעיף "הפעלת התכשיר")

| הגידול   | המינון (סמ"ק/ד') | מועד הטיפול  |
|--|------------------|--|
| הדרים  | 400 - 500*       | החל מהנטיעה, סתיו- אביב.   |
| אבוקדו, אנונה, זית, ליצי, מנגו   | 300 - 400*       | החל מהנטיעה, סתיו- אביב.   |
| אפרסמון, אפרסק, אגס, גפן, חבוש, קיווי, רימון, משמש, נקטרינה, שזיף, שקד, תפוח | 300 - 400*       | החל מהנטיעה, מהסתיו לאחר הקטיף ועד שבוע לפני ההתעוררות בלבד. בגפן כנ"ל ולפחות 6 חודשים לאחר הנטיעה.                |
| בנות   | 200 - 300*       | בשטח מוכן לשתילה סתיו-חורף, בשטחים לשתילת אביב.  |
| תמר מתום שנתיים לנטיעה   | 400              | סתיו-אביב. לשיפור קטילת עשבייה קיימת מומלץ לשלב ראונדאפ/גלייפוגן בריכוז 1%-2% לפי גובה ועוצמת השיבוש במועד הריסוס. |

**הערה:** היזהר מהרטבת עלוות הגידול בשעת הריסוס.

\* המינון הגבוה ימנע הצצת עשבים לתקופה ארוכה יותר.

ניתן לשלב גליגן עם מגלן בגידולים: אבוקדו, אפרסמון, גפן, הדרים, אפרסק, זית, ברוש, אורן